

ケイピン[®]エース

農林水産省登録 第21217号
農薬の種類 イマザピル剤

・有効年限 5年
・包装 50本×10ケース×6箱
・魚毒性 A類（原体）
・P R T R -

特徴

- クズ用及び木本性つる類用除草剤
- クズ及び木本性つる類枯殺専用剤で直接差込み処理するため、環境への影響が極めて少ない。
- 木芯状の製剤で、持ち運びに便利で能率的な作業が可能である。

作物名・使用できる場所

すぎ・ひのき（下刈り代用）、造林地
公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、宅地、運動場、のり面等

適用病害虫・雑草木名

クズ、木本性つる類

注意事項その他

適用表、効果・薬害の注意、安全使用上の注意はPDFでご覧になれます。

® は登録商標です

掲載するにあたり万全を期しておりますが、使用する際にはラベルを良くお読み下さい

ケイピンエース

■適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	イザピルを含む農薬の総使用回数
すぎ (下刈り代用) ひのき (下刈り代用)	—	クズ	萌芽期 ～ 生育期	一株当たり 1～3本	—	クズの根株、又はなるべく根元に近い茎にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を葉の露出部全部がかくれるように差し込むこと。	—
林木	造林地	木本性 つる類		つる径(cm) 本数(本) ～3.0 1～2 3.1～5.0 3～4 5.1～6.0 5～6 6.1以上 7～		つる類の地際に近い位置にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を葉の露出部全部がかくれるように差し込むこと。	
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面等	クズ		一株当たり 1～3本	1回	植栽地を除く樹木等の周辺地のクズの根株、又はなるべく根元に近い茎にあらかじめ本剤を差し込むために適当な穴をあけ、本剤を葉の露出部全部がかくれるように差し込むこと。	1回

■効果・薬害等の注意

- (1) 緑地管理地及び造林地（すぎ、ひのき）の下刈り代用として使用する。
- (2) 根株に差し込むのが最も効果的である。
- (3) つる（茎）に差し込む場合は直径が1 cm以上のものに限って差し込む。但し下刈り代用の場合は直径3 cm以上の株のみ処理し、つるには処理しない。
茎葉散布剤処理後残った大株に処理するようにする。
- (4) 処理後、抜けて落ちると造林木に薬害を生ずる恐れがあるので、簡単に抜けないよう適当な太さの錐などで穴を空けて差し込む。
- (5) 使用時期は通年でよいが、根株のを見つけ易い秋～春がより効果的である。
- (6) 薬剤が雨、雪などで流れ落ちると造林木に薬害発生の恐れがあるので、葉の露出部が全部隠れるよう差し込む。

- (7) 降雨、降雪中での使用は避ける。
- (8) 使用にあたっては、使用量、使用方法、使用条件（土壌条件など）を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は林業関係機関等の指導を受けることが望ましい。
- (9) 処理の前後に処理株のつる切りを行うと、切口の溢泌水によって植栽木に薬害を生ずることがあるので注意する。

■安全使用上の注意

手袋着用

- (1) 使用の際は不浸透性手袋などを着用する。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。
- (3) 公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- (4) 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管する。

保 管： 食品と区別し、密封して直射日光を避け、子供の手のとどかない冷涼・乾燥した所に保管する。